



## ◆当面の管理について

1. 副梢整理の不徹底な園が散見されます。食味不良と収穫時期の遅れとなりますので随時管理を行ってください。
2. シャインマスカットやクイーンルージュの弱樹勢や若木等で着色・食味が進んでいるものは出荷開始日以前に荷受対応をしますので各センターまでご相談ください。

## ◆クイーンルージュ®苗木について

果樹秋苗の注文取りまとめ時期となりますが、下記についてご注意をお願い致します。不明な点は、果樹技術員まで相談ください。

1. 購入に当たり
  - 1) 専用注文書によるとりまとめになります。
  - 2) 植付圃場の住所が必要になります。
  - 3) 新規に購入する場合は、誓約書が必要になります。  
過去に、親族が購入していた場合は、新規に誓約書が必要になります。
2. クイーンルージュ®を継承された方へ
  - 1) 親族や他人から、クイーンルージュ®を継承した場合で、誓約書の提出をされていない方は、誓約書の提出が必要です。  
例1) 父親がクイーンルージュ®を購入（園地所在地報告・誓約書提出済）し、栽培販売をしていた。経営移譲を受け、子が現在栽培販売をしている。  
⇒子が誓約書の提出が必要  
例2) 知人がクイーンルージュ®購入（園地所在地報告・誓約書提出済）し、栽培販売をしていた。園地ごと借り受けて、自身が栽培販売を始めた。  
⇒借り受け人の誓約書の提出が必要。  
例3) 母親がクイーンルージュ®を購入（園地所在地報告・誓約書提出済）した。しかし、栽培販売は子が始めた。  
⇒子の誓約書の提出が必要
3. 苗木を購入したが、余ったので他者に譲渡したい  
⇒禁止されています。

## ◆シャインマスカット・クイーンルージュ®

### 収穫出荷講習会開催について

#### 《松代・川中島・更北地区》

内容	開催日	開催時間	開催場所
検査・出荷講習会	9月4日（水）	午前11時	川中島共選所
		午後2時	松代農業総合センター
		午後2時	真島フルーツセンター

※検査時間までに、品質調査用の房（袋に氏名記入）を各センターまで持ち込み下さい。

## 《若穂地区》

内容	開催日	開催時間	開催場所
出荷講習会	9月4日(水)	午後1:30	若穂果実流通センター

## ◆シャインマスカット・クイーんルージュ®目揃い会開催について

ブロック	開催日	開催時間	内容	開催場所
篠ノ井	9月12日(木)	午後1時30分	選果目揃い会	西部流通センター
				東部流通センター
松代 川中島 更北	9月12日(木)	午後1時30分	3ブロック合同 選果目揃い会	松代農業総合センター
若穂	9月12日(木)	午後1時30分	選果目揃い会	若穂果実流通センター

## ◆長野県果樹試験場果実品質調査(糖度)について

基準日	ナガノパープル			シャインマスカット		
	令和6年	令和5年	平均値	令和6年	令和5年	平均値
8/5	15.5	15.0	15.1	13.5	13.5	11.7
8/12	17.6	16.9	17.4	15.4	15.9	14.1
8/19	18.4	18.2	18.9	16.6	17.7	15.6
8/26		19.2	20.1		18.9	17.0
9/2		19.9	21.2		20.3	17.8
9/9		20.1	21.9		21.2	18.7
9/16		20.3	22.2		22.2	19.2
9/23	—	—	—		22.8	19.6

お盆前後～8月下旬にかけて曇天雨の日が多かったため糖度の上昇が鈍くなっております。収穫を進めていくと未熟な部分も取ってしまう可能性がある為、糖度と食味を必ず行いながら収穫を進めてください。

## ◆種なしぶどうの施肥（礼肥と元肥同時施用）について

（種なし巨峰・ナガノパープル・シャインマスカット・クイーンニーナ等 樹勢を落ち着かせることが重要！！）

1. 遅効きを防止するため、早めの施肥を心掛ける。（収穫中に施用）
2. 種なしぶどうの好適樹相は「開花期までに一気に90cm程度まで伸び、その後2回の摘心で150cm程度に抑えられる」樹勢です。  
このため、早期に施用し開花期に肥効が切れるようにしたい。
3. 種あり巨峰と生理が全く違う。種あり巨峰と同じ施肥はさける。

施用時期	肥料名	施用量	成分量 (kg)
9月下旬	なたね粕	3袋	N3.0-P1.2-K0.6
9月下旬～ 10月上旬	グリーン長野果樹専用有機入り72	2袋	N3.2-P0.8-K0.4-苦土0.6
	果樹の力	2袋	苦土13.6

※幼木～若木（5年生ぐらい）や樹勢が強い場合は窒素成分の入っている肥料「グリーン長野果樹専用有機入り72」を施用しない。

※成木化しても樹勢が落ち着かない場合は上記の内「グリーン長野果樹専用有機入り72」を2分の1～3分の1程度の施肥量とする。いきなり無肥としてしまうと極端に樹勢が落ちる場合がある。樹勢により施肥量を調整される場合は果樹技術員までご相談下さい。

## ◆施肥（ぶどう共通）について

1. 樹勢に応じて施肥量を調整する。新梢の太さなどを見て判断する。
2. 種あり巨峰で樹勢が弱い場合は、なたね粕を2袋追加する。
3. 種なし品種で樹勢が弱い場合は、なたね粕を1袋、グリーン長野果樹専用有機入り72を1袋追加する。  
樹勢が強い（棚が埋まり、新梢が太い）場合は、開花以降に肥効が切れる程度に施肥量を減らす。
4. ホウ素欠乏対策として3年に1回「ほう砂」を10a当たり3kg施用する。

## ◆台風対策について

1. 被害にあった場合の対応について
  - 1) 脱粒や、つぶれた粒が多くなるので、被害程度を確認し、園内で被害の多いところから収穫を急ぐ。
  - 2) 傘により穂軸の障害が多く見られる場合も同様に早めに収穫する。
  - 3) 袋内で裂果した果粒は腐敗しやすいので粒抜き等の処理を行う。  
荷造り時には細心の注意を払い傷果の混入を防ぐ。
  - 4) 落果房の加工対応や裂果の多い房の特別荷受けについて不明な点は、各共選所・果樹技術員まで。
  - 5) 折れた枝の傷口にはトップジンMペースト等を塗布する。
2. 今後の台風対策について
  - 1) 棚の張線等を締めなおし強風に備える。
  - 2) 棚は上下動を防ぐことが重要なので、棚の内部に「アンカー」や「おもし」で引き下げたり、支柱で突き上げたりして、棚が上下に揺れないように固定する。
  - 3) 苗木は支柱で固定し、倒伏防止を図る。
  - 4) 園内に排水路を設けるなどして、雨が溜まらない様にする。

