



《共通事項》

◆定期的なかん水について

晴天が5～6日(砂を含む土は4日)続いたら20～30mm程度のかん水を行なう。
10aに1mmのかん水をするには水1,000ℓが必要です。樹冠下に集中して行う。

《プルーン・すもも》

◆晩生種の特別薬剤散布について

1. 散布時期:8月14日(水)～18日(日) 実際散布日記入 月 日
2. 調合量:水100ℓ 当り ※混用順に記載。 ※収穫中の品種に飛散しないよう十分注意する。

農薬名	使用量	対象病虫害	収穫前
(展着剤まくぴか)	10mℓ	機能性展着剤	—
アンビルフロアブル	100mℓ	灰星病	前日まで
Ⓜモスピラン顆粒水溶剤	50g	シンクイムシ類	前日まで

3. 散布量…10a当り ⇒ 400ℓ

4. 留意事項

- ①9月に収穫する品種は、特別薬剤散布として行う。年間使用回数に注意する。
②シンクイムシ類・灰星病の発生が多く、薬液をしっかりと付着させたい場合は、均一に付着しやすく、乾きが早まり、液だまりが減少する展着剤の「まくぴか」10,000倍(水100ℓ当り10mℓ)を使用する。

◆収穫前薬剤散布について ※収穫直前の品種に行う。

収穫前の降雨によっては、腐敗果の発生が増加するため、特に収穫前の防除を徹底する。

1. 散布時期…収穫開始2日前 実際散布日記入 月 日
2. 調合量…水100ℓ 当り ※混用順に記載。

農薬名	使用量	対象病虫害	収穫前
オンリーワンフロアブル	50mℓ	灰星病	前日まで
(Ⓜスカウトフロアブル)	50mℓ	シンクイムシ類	前日まで

3. 散布量…10a当り⇒350ℓ

4. 留意事項

- ①「収穫前日まで」となっている農薬は、収穫24時間前までに散布が終了する事を意味する。
②シンクイムシ類の発生が心配される園は、スカウトフロアブル 2,000 倍を加用散布する。スカウトフロアブルに代えて、ディアナWDG5,000 倍(水100ℓ当り20g/収穫前日)を使用してもよい。

◆プルーン出荷上の留意点について

下記内容の問題点が毎年出ている。出荷時に注意して下さい。

- ①農薬による汚れのある果実が見られるのでふきとって出荷する。
②果実にシンクイムシ、灰星病のものが散見される。⇒ 厳正に荷造りし混入しない
③過熟果・未熟果の出荷がある。(農家間の差が意外と大きい)
④玉の大きさにムラがある。(同じ大きさに420g以上になるように詰める)

- ⑤パック重不足がある。 ⑥異品種の混入がある。 ⑦返品されたものを取りに来ない方がいる。

◆スモモヒメシンクイの対策の徹底について《重要》

スモモヒメシンクイが食入する時期のため、園をまわって樹上や樹冠下の被害果の処分に当たる。

1. 薬剤防除・耕種的防除

- ①定期防除は、期日を守りムラなく散布し、量をしっかりと掛ける。
②園内をこまめに巡回し、樹上の被害果・落果した被害果の被害果をすべて見つけ処分する。

2. 処分方法

- ①被害果を園外に持ち出し、7日以上水漬けし果実中の幼虫を殺す。
②土中に埋める場合は50cm以上深く埋める。浅いと羽化し再び発生するので注意する。
③厚い肥料袋等に被害果を入れ、羽化成虫が外に飛び出さないよう口を固く結ぶ。レジ袋等不可。
④放任園や自家用で、防除しないプルーン・すもも等の発生源を伐採してもらう。

3. 被害果の特徴

- ①アメをだす。 ②果面に地図を描く。 ③果面が黄色や紫色に変色する。 ④落果している。

《なし》

◆当面の管理について

1. 南水栽培園は、防鳥ネットの設置を行う。(収穫1ヶ月前)

◆第12回薬剤散布について

1. 散布時期:8月14日(水)~8月18日(日) 実際散布日記入 月 日
2. 調合量:水100ℓ 当り

農薬名	使用量	対象病害虫	収穫前
展着剤	10ml	—	—
アーデントフロアブル	50ml		前日
キノドー顆粒水和剤	100g	黒斑病・輪紋病	3日前

3. 散布量:10a当り⇒棚栽培400ℓ/立木栽培450ℓ以上

4. 留意事項

- ①収穫間際のオーロラには散布しない。
②他の作物にかからないよう十分注意し散布する。
③アーデントフロアブルに代えてイカズチWDG1,500倍(水100ℓ当り66g)を使用してもよい。

◆第13回薬剤散布について

1. 散布時期:8月24日(土)~8月28日(水) 実際散布日記入 月 日
2. 調合量:水100ℓ 当り

農薬名	使用量	対象病害虫	収穫前
展着剤	10ml	—	—
キノドー顆粒水和剤	100g	黒斑病・輪紋病	3日前

3. 散布量:10a当り⇒棚栽培400ℓ/立木栽培450ℓ以上

4. 留意事項

- ①収穫間際の豊水には散布しない。
②他の作物にかからないよう十分注意し散布する。

◆西洋梨「オーロラ」荷受について

荷受日	荷受時間	荷受場所
8月12日(月)	午前 9:00まで	西部流通センター・松代総合センター

1. 荷受方法

- ①コンテナは、各集荷場所(各流通センター)のりんご用コンテナを使用する。
- ②コンテナには新聞紙等を敷いて、押し傷をつけないように中小玉は2段詰め、大玉は1段詰めにする。
(押し傷防止のため)。また、コードNo.を記入した用紙を入れる。(コンテナ毎に1枚)

※注意事項

収穫間際の防除に十分注意をする。特に定期防除第11回目は、遅れないように防除を行う。

◆なし贈答用ダンボール(5kg)注文について

贈答用のダンボールを必要な方は、8月26日(月)までに各流通センター・共選所へ申込下さい。