



《ブルー・すもも》

◆第12回薬剤散布について(お盆前後に収穫になる品種以降)

1. 散布時期・・・7月26日(水)～7月30日(日) 実際散布日記入 月 日

2. 調合量・・・水100ℓ 当り ※混用順に記載。 ※収穫中の品種に飛散しないよう十分注意する。

農薬名	使用量	対象病害虫	収穫前
(展着剤まくぴか)	10ml	—	—
ベルコートフロアブル	50ml	灰星病	3日前まで
ⓂイカズチWDG	66g	シンクイムシ類	前日まで

3. 散布量・・・10a当り⇒400ℓ

4. 留意事項

- ①果実の汚れを防ぐため、なるべく細霧にして、すぐに乾く時間帯で散布する。
- ②シンクイムシ類・灰星病の発生が多く薬液をしっかりと付着させたい場合は、展着剤を「まくぴか」10,000倍(水100ℓ当り10ml)を使用すると、均一に付着しやすくなり乾きが早まるため、液だまりが減少する。
- ③ベルコートフロアブルは収穫3日前までなので、収穫中・収穫直前の品種にかからないようにする。

◆収穫前薬剤散布について ※収穫直前の品種に行う。

収穫前の降雨によっては、腐敗果の発生が増加するため、特に収穫前の防除を徹底する。

1. 散布時期・・・収穫開始2日前 実際散布日記入 月 日

2. 調合量・・・水100ℓ 当り ※混用順に記載。

農薬名	使用量	対象病害虫	収穫前
オンリーワンフロアブル	50ml	灰星病	前日まで
(Ⓜスカウトフロアブル)	50ml	シンクイムシ類	前日まで

3. 散布量・・・10a当り⇒350ℓ

4. 留意事項

- ①「収穫前日まで」となっている農薬は、収穫24時間前までに散布が終了する事を意味する。
- ②シンクイムシ類の発生が心配される園は、スカウトフロアブル 2,000倍を加用散布する。スカウトフロアブルに代えて、ディアナWDG5,000倍(水100ℓ当り20g/収穫前日)を使用してもよい。

◆着色難品種の着色向上収穫前管理について

着色難な品種は、しっかりと着色管理(葉摘み・反射シート)を行う。

◆スモモヒメシンクイ対策について

発生時期であるので樹上や樹冠下の被害果の処分や農薬散布を徹底する。

◆南水品評会開催のお知らせについて

本年も南水の栽培に活気をつけるため、品評会を実施することとなりました。大勢の皆様のご出品をお願い致します。

日時 : 9月中下旬頃を予定しています(後日連絡)

規格 : ①品種 南水

②大きさ 440g以上/玉(昨年より小さくしました)

③玉数 7玉入り +1玉(検査後の詰め替え用)

出品数 : 1名につき1点まで

出品資格 : 部会員である。栽培日誌を提出してある。JAへの出荷がある。

出品方法 : 部会で3kgダンボール・モールドパック等を用意します。

※詳しい評価方法(審査基準)・資材配布については今後の特産果樹情報でお知らせします。

《栽培に関する問合せ》

寺澤(篠ノ井西部・信田) : 080-1188-5229 / 外谷(篠ノ井東部) : 080-8048-6602

松橋(松代) : 090-4816-6297 / 佐藤(川中島) : 090-7179-9866

根津(更北) 080-1203-8576 / 松澤(若穂) 080-1191-5166

吉澤(全域・編集担当) : 090-2543-0365 / 営農販売部(本所) : 292-0930

○果樹のアドバイザー(流通センター長兼務)

※センター繁忙期になるため、電話をとれない場合がありますが、ご了承下さい。

伊藤(篠ノ井東部) 080-2239-6816 / 松坂(篠ノ井西部) 080-1188-413

《販売に関する問合せ》各流通センター・共選所 / 営農販売部(本所) : 292-0930

《資材に関する問合せ》各JAファーム・営農資材センター・経済部 / 農業資材課 : 299-3311